



Medida	Fórmula	Interpretación
Variabilidad	$(\text{PEF mayor} - \text{PEF menor}) / \text{PEF mayor} * 100$	No debe ser mayor al 20%, indica inestabilidad.
Reversibilidad o Broncodilatación	$(\text{PEF post} - \text{PEF previo}) / \text{PEF previo} * 100$	Es positivo con un cambio mayor al 15% (o 20%).
Provocación Bronquial con el Ejercicio	$(\text{PEF basal} - \text{PEF post}) / \text{PEF basal} * 100$	Es positivo con una caída del PEF mayor al 15% (o 10%).

1. Linares P., Marcela, Sánchez D., Ignacio, Corrales V., Raúl, Díaz C., Armando, & Escobar C., Ana María. (2000). Pruebas de función pulmonar en el niño. Revista chilena de pediatría, 71(3), 228-242. <https://dx.doi.org/10.4067/S0370-41062000000300010>
2. Céspedes G, Juan, Gutiérrez C, Mónica, & Oyarzún G, Manuel. (2010). Flujometría en la práctica de atención primaria. Revista chilena de enfermedades respiratorias, 26(1), 47-48.
3. Sepúlveda M, Ricardo. (2004). El flujómetro de Wright: Una herramienta indispensable en la práctica ambulatoria. Revista chilena de enfermedades respiratorias, 20(2), 80-84.